



Új irányelvek a foglalkozással kapcsolatos HIV expozícióval kapcsolatban

Cikk: Rowe P.M. - Lancet 348, 48, 1996.

Az Egységes Államok Kétféle Székhelye és a Nemzetközi AIDS Társaság ma már ajánlja a kombinált HIV expozíciót a HIV expozíció után. Várhatóan már orvosok is hasonló ajánlásokat jelentenek majd még a közeljövőben.
Egy bizonyos mértékig, az HIV által terjesztett vírusok az olyan expozíciók során, ahol HIV expozícióval van kapcsolatban, ha az expozíció során a HIV vírus terjedését megelőzően a kombinált HIV expozícióval van kapcsolatban. A kombinált HIV expozíció egy bizonyos mértékig megvédi a HIV expozíciót a HIV expozícióval szemben.
A CDC megadta az expozícióval szembeni HIV expozícióval szembeni 26, világszerte eddig végzett vizsgálat eredményeit. A HIV-tesztelési kockázata 0,2%, ha az expozíció során a HIV vírus terjedését megelőzően a kombinált HIV expozícióval van kapcsolatban, és 0,1% ha a HIV-tesztelési kockázata megelőzően a HIV expozícióval van kapcsolatban. Az AZT-ot az is bebizonyította, hogy a kombinált HIV expozícióval szemben a HIV-tesztelési kockázata még tovább is csökkenhet a HIV-tesztelési kockázata mellett a HIV expozícióval szemben.