



# A humán immundeficiencia vírus átvitel longitudinális vizsgálata heteroszexuális partnereknél

**Cikk:** de Vincenzi I. és a HIV Heteroszexuális Átvitelét Tanulmányozó Európai Munkacsoport - New Engl. J. Med. 331, 341, 1994.

A humán immundeficiencia vírus (HIV) fertőzés egyik szexuális partnerrel való kapcsolatból történő terjedését vizsgálta. Két csoportot vizsgáltak: az egyiket a HIV-fertőzés előtti szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján, a másikat a HIV-fertőzés utáni szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján. A vizsgálatot 1987 és 1992 között végezték, a résztvevők száma 770 pártól 74-nak csökkent. A 204 pártól, akiknél a HIV-fertőzés előtti szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés előfordult, a HIV-fertőzés utáni szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés nem fordult elő. A 566 pártól, akiknél a HIV-fertőzés előtti szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés nem fordult elő, a HIV-fertőzés utáni szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés fordult elő. A HIV-fertőzés előtti szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés előfordulásának valószínűsége a HIV-fertőzés utáni szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés előfordulásának valószínűségéhez képest 12,7%-kal magasabb volt. A HIV-fertőzés előtti szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés előfordulásának valószínűsége a HIV-fertőzés utáni szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés előfordulásának valószínűségéhez képest 12,7%-kal magasabb volt. A HIV-fertőzés előtti szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés előfordulásának valószínűsége a HIV-fertőzés utáni szexuális partnerrel való kapcsolatuk alapján a HIV-fertőzés előfordulásának valószínűségéhez képest 12,7%-kal magasabb volt.