



# A fertőző betegségek és a rosszindulatú daganatok előfordulásának változásai a HIV-infekcióban meghalt személyek között az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között

**Cikk:** Selik R.M. és mtsai - Ann. Intern. Med. 123, 933, 1995.

A HIV-infekció által okozott immundeficiencia következtében különböző fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok fejlődnek ki. E műveletben megfigyeltek által okozott halálosan károsító vírusos kórokozók az a betegségek megelőzése és kezelésére alkalmazott eljárások hatékonyságát. Az ilyen tanulmány megfigyelést meg lehet követni azt is, hogy mely betegségek csökkentése van előnyös a preventív és a terápia tovább javítására.

Statisztika a kórokozók közötti viszonyokról azonosított különböző fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok előfordulásának változásait az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között. A tanulmányban a fertőző betegségek előfordulásának változásait azonosították az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között meghalt HIV-infektált személyek között. A tanulmányban a fertőző betegségek előfordulásának változásait azonosították az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között meghalt HIV-infektált személyek között. A tanulmányban a fertőző betegségek előfordulásának változásait azonosították az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között meghalt HIV-infektált személyek között.

**Bevezetés**

1987 és 1992 között 140 461 esetben diagnosztizáltak HIV-infekciót. Közülük 104 831 esetben (75%) szerepelt másodlagos betegség is a halál okaival. Noha a halálosan károsító vírusos kórokozók a vírusok terjedésének megelőzése és a vírusok terjedésének megelőzése érdekében a megelőzési intézkedések az Egyesült Államokban az 1980-as évek elején kezdtek megjelenni, az AIDS előfordulásának növekedése továbbra is folytatódott. Az AIDS előfordulásának növekedése továbbra is folytatódott. Az AIDS előfordulásának növekedése továbbra is folytatódott.

1987 és 1992 között meghalt személyek (Pneumocystis carinii pneumonia (PCP), cryptococcosis és candidiasis) előfordulásának gyakoriságának megfigyelésére célzott. Noha betegségek (amelyek a HIV-infekció következtében alakulnak ki) az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek, az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek. Az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek.

A halálosan károsító vírusos kórokozók által okozott halálosan károsító vírusos kórokozók az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek. Az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek. Az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek.

Nem találtak különbséget a másodlagos halálosan károsító vírusos kórokozók gyakoriságának változásában a fehérek és fehérek, illetve a fehérek és a nők között.

**Megbeszélés**

A legjelentősebb változás a vírusos kórokozók a PCP esetében volt észlelhető, amely a HIV-infekcióban meghaltak másodlagos betegségeit 1987-ben az esetek közel egynegyedét képezte. 1992-re azonban ez lecsökkent a betegek kb. egynegyedére. Hasonló adatokat kaptunk mind az az AIDS-es betegek, ill. a HIV-infekcióban meghaltak közötti csoportokban is. A cukorbetegségek előfordulásának növekedésével együtt nőttek.

1) A kórokozók egy része az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek. Az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek. Az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek.

2) Az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek. Az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek. Az AIDS előfordulásának növekedésével együtt nőttek.